

Інструкція-вкладиш до упаковки: інформація для пацієнта

Galvenox Venо **500 мг, тверді капсули** *кальцію добезилату моногідрат*

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить важливу для вас інформацію.

- Збережіть цей вкладиш, можливо, вам доведеться прочитати його ще раз.
- Якщо у вас є додаткові запитання, зверніться до свого лікаря або фармацевта.
- Цей препарат призначений конкретній людині. Його не слід передавати іншим. Препарат може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми у них однакові.
- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, включно з будь-якими побічними ефектами, не перерахованими в цій інструкції, зверніться до свого лікаря або фармацевта. Дивіться пункт 4.

Зміст інструкції

1. Що таке Galvenox Venо і для чого він використовується
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Galvenox Venо
3. Як застосовувати Galvenox Venо
4. Можливі побічні ефекти
5. Як зберігати Galvenox Venо
6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Що таке Galvenox Venо і для чого він використовується

Galvenox Venо – це тверді капсули. Містить діючу речовину кальцію добезилату моногідрат, який діє на стінки капілярів. Зменшує їх надмірну проникність і крихкість, підвищує міцність, запобігаючи просочуванню рідини крізь стінки судин.

Крім того, він прискорює синтез колагену, який є важливим структурним компонентом стінок артерій.

Galvenox Venо знижує в'язкість крові, підвищує еластичність еритроцитів, а також має антиагрегуючу дію. Це покращує периферичний венозний кровообіг, зменшує застій у венозних судинах і гальмує розвиток тромботичних змін, що супроводжують утворення варикозного розширення вен.

Galvenox Venо також зменшує проникність і ламкість лімфатичних судин і покращує лімфодренаж, зменшуючи набряк.

Показання до застосування препарату

Симптоми хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок: біль, судоми, відчуття тяжкості в ногах, поколювання, оніміння в нижніх кінцівках, зміни шкіри, пов'язані з венозним застоєм, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, набряки, пов'язані з хронічною венозною недостатністю. Симптоматичне лікування геморою.

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Galvenox Venо

Не приймати Galvenox Venо:

- якщо у вас алергія на діючу речовину або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені в пункті 6),
- дітям.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Зверніться до лікаря, якщо у вас активна виразка шлунка та/або дванадцятипалої кишки або хронічний гастрит. Рекомендується періодичний контроль функції шлунка та дванадцятипалої кишки. У разі загострення симптомів прийом препарату слід припинити і звернутися до лікаря.

Негайно припиніть застосування препарату та зверніться до лікаря, якщо у вас виникли такі симптоми, як: лихоманка, біль у горлі або гортані, біль при ковтанні, риніт, стоматит, запалення в оєолицях статевих органів та проктит, оскільки це може бути симптомами тяжкого захворювання – агранулоцитозу.

Зверніться до лікаря, навіть якщо наведені вище застереження стосуються ситуацій у минулому.

Застосування Galvenox Veno пацієнтам з порушенням функції нирок

Людам з тяжкою нирковою недостатністю, особливо тим, хто перебуває на діалізі, слід застосовувати знижені дози.

Діти

Дія цього препарату на дітей віком до 12 років не вивчалася. Препарат не слід застосовувати дітям.

Інші препарати та Galvenox Veno

Слід повідомити лікаря про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або приймав нещодавно, і про препарати, які пацієнт планує приймати.

Даних про взаємодію препарату з іншими лікарськими засобами немає.

Galvenox Veno з їжею і питтям

Препарат призначають внутрішньо під час основного прийому їжі.

Вагітність і грудне вигодовування

Якщо ви вагітні або годуйте груддю, припускаєте, що вагітні або плануєте вагітність, зверніться за консультацією до лікаря, перш ніж приймати цей препарат.

Вагітність

Galvenox Veno можна застосовувати під час вагітності, лише якщо потенційна користь перевищує можливий ризик для плоду.

Galvenox Veno протипоказаний в першому триместрі вагітності.

Грудне вигодовування

Препарат проникає в грудне молоко в невеликих кількостях. Даних про вплив препарату на дитину, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, немає.

Перед початком лікування жінка повинна припинити грудне вигодовування.

Керування транспортними засобами та обслуговування машин

Galvenox Veno не впливає на здатність керувати автомобілем та обслуговувати машини.

Galvenox містить азорубін (E122)

Препарат містить азорубін (E122) і може викликати алергічні реакції.

3. Як застосовувати Galvenox Veno

Цей препарат слід застосовувати точно так, як описано в цій інструкції, або за вказівками лікаря або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, якщо є сумніви щодо цього.

Рекомендована доза

Якщо інше не призначено лікарем, дорослі зазвичай приймають від 1 до 2 капсул на день (що відповідає добовій дозі від 500 мг до 1000 мг кальцію добезилату моногідрату).

Тривалість лікування зазвичай становить від кількох тижнів до кількох місяців.

Спосіб введення

Препарат приймається перорально під час основного прийому їжі.

Передозування

У разі прийому дози препарату, що перевищує рекомендовану, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.

Якщо ви забули прийняти Galvenox Veno

Не застосовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.

Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до лікаря або фармацевта.

4. Можливі побічні ефекти

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не у всіх.

Рідко (менше 1 з 1000 осіб, але більше 1 на 10 000 осіб) зустрічаються:

- епігастральний біль,
- нудота,
- діарея,
- блювота,
- шкірні реакції,
- біль в суглобах,
- головний біль і запаморочення,
- лихоманка.

Дуже рідко (менше 1 з 10 000 осіб) спостерігалось пригнічення кісткового мозку з агранулоцитозом (гострий стан, який може проявлятися високою температурою, інфекціями в ротовій порожнині або запаленням заднього проходу та статевих органів). У таких випадках припиніть застосування препарату та зверніться до лікаря.

Повідомлялося про місцеві алергічні реакції (висипання) та системні реакції (кропив'янка).

Більшість побічних реакцій зникають після припинення прийому Galvenox або зменшення дози.

Як повідомити про побічні ефекти

Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти включно з будь-якими побічними ефектами, не перерахованими в цій інструкції, зверніться до свого лікаря або фармацевта. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо у відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів.

Ал. Єрозолімські 181С

02-222 Варшава

Тел.: +48 22 49 21 301

Факс: +48 22 49 21 309

Веб-сайт: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Про побічні ефекти також можна повідомити власника реєстраційного посвідчення.

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку цього препарату.

5. Як зберігати Galvenox Veno

Зберігати при температурі нижче 25°C. Зберігати в оригінальній упаковці з метою захисту від вологи.

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці.

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного після: EXP. Термін придатності відноситься до останнього дня цього місяця.

Ліки не слід викидати через стічні води або до домашніх відер з побутовими відходами. Запитайте свого фармацевта, як позбутися ліків, які більше не потрібні. Така поведінка допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Склад препарату Galvenox Veno

- діюча речовина кальцію добезилату моногідрат. Одна тверда капсула містить 500 мг кальцію добезилату моногідрату.

- допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, титану діоксид (E171), азорубін (E122), хіноліновий жовтий (E104), желатин.

Вигляд Galvenox Veno та вміст упаковки

Galvenox випускається у вигляді твердих капсул. Капсула циліндрично-овальна, двочастинна. Внутрішня частина (корпус) - біла, зовнішня частина (шапка) - червона. Вміст капсули - порошок білого або майже білого кольору.

Доступні упаковки:

30 твердих капсул

60 твердих капсул,

Упаковка - блістери ПВХ/ПВДХ/Алюміній в картонній коробці.

Не всі розміри упаковок знаходяться в обороті.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник

Фармацевтичний Трудовий Кооператив "ГАЛЕНА"

вул. Круча 62

53-411 Вроцлав

Польща

Дата останньої актуалізації вкладиша: kwiecień 2021